

იზოტოპური ეფექტის კვლევა ზეკრიტიკული სითხეების ქრომატოგრაფიისა და ტანდემური მას-სპექტრომეტრიის გამოყენებით

ვაჟა ტყემალაძე¹, საბა ჯორბენაძე¹, ალუდა ჭელიძე¹, ჯორჯია სპრეგა², ბეჟან ჭანკვეტაძე¹

vajadasergi@gmail.com

- 1) ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის დეპარტამენტი, ზუსტიდასაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ი.ჭავჭავაძის გამ. 1, 0179, თბილისი, საქართველო
- 2) თანამედროვე ბიომედიცინის მეცნიერებებისა და საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტი, *Università Politecnica delle Marche, 60121, ანკონა, იტალია*

წინამდებარე კვლევის მიზანი გახლდათ ისეთი მეთოდის შემუშავება ზეკრიტიკული სითხეების ქრომატოგრაფიისა და ტანდემური მას-სპექტრომეტრიის საშუალებით, რომლითაც მოხდებოდა იზოტოპოლოგების დაყოფა ერთმანეთისგან, ქირალურ და აქირალურ ქრომატოგრაფიულ სვეტზე ამფეტამინის, მისი ნაწარმების და ანალოგების მაგალითზე.

ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა რომ ძლიერი იზოტოპური ეფექტი მიიღწევა მეტამფეტამინისა და მისი დეიტერირებული ნაწარმების ანალიზისას, კერძოდ კი მიიღწევა მათი ფუძისეული დაყოფა სხვასდასხვა ქირალური თუ აქირალური სვეტების გამოყენებისას ზეკრიტიკული სითხეების ქრომატოგრაფიის საშუალებით. იზოტოპური ეფექტის ბუნება (ნორმალური თუ შებრუნებული) დამოკიდებულია სელქტორის ქიმიურ შედგენილობაზე, საანალიზო გარემოზე და ნივთიერების სტრუქტურაზე. ზოგიერთ ქირალურ სვეტზე შევამჩნიეთ კორელაცია იზოტოპურ ეფექტსა და ენანტიომერულ დაყოფას შორის.